

MAKSANSIIRTOPOTILAAN IMMUNOSUPPRESSIIVINEN LÄÄKITYS

Tämä ohje perustuu HYKSin ohjeeseen 2/2010

CyA- ja takropitoisuudet ovat viitteellisiä ja potilaskohtaisesti niistä voidaan poiketa. Kortikosteroidilääkityksen käytössä on otettava huomioon perustauti ja mahdolliset rejektiot.

Maksansiirrosta	0-1 kk	-3 kk	-6 kk	-1 v	-2 v	>2 v
Pitoisuussuositus:						
-B-CyA $\mu\text{g/l}$ (CMIA)	220-250	175-225	150-200	125-175	100-150	75-125
-B-Tacro ($\mu\text{g/l}$)	10-15	8-12	5-10	4-8	4-8	4-8
-B-Everolimuusi ($\mu\text{g/l}$)		8-10	8-10	8-10	8	8
-B-Sirolimuusi ($\mu\text{g/l}$)		8-12	8-12	8-10	8	8
Annos (siirtoyksikön suositus)						
-MP (mg/kg)	0,2	0,2	0,1	$\Rightarrow 0$	0	0
-Atsatiopriini (mg/kg)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,75
-MMF (g)	2	1	1	1	1	1

MP: metylprednisoloni

MMF: mykofenolaattimofetiili, CellCept[®]

Tacro: takrolimuusi, Prograf[®], Advagraf[®]

-Advagraf[®] otettava aina aamulla (pitoisuusmääritys 24 tuntia annoksesta)

El Heimo Nurmi, Gastroenterologian poliklinikka, os. 227